# Note sur quelques Cerambycidae du Massif armoricain (deuxième note)

Xavier GOUVERNEUR[1] & Philippe GUERARD[2]

**Mots-clés** – Cerambycidae, Lamiinae (*partim*), Massif armoricain.

**Résumé** – Une clé de détermination est proposée pour les deux espèces de Lamiinae observées dans le Massif armoricain.


**Abstract** – Note to facilitate recognition of two longhorn beetles species encountered in Massif armoricain, and belonging to the Lamiinae subfamily.

Cette deuxième note traite de deux espèces de Cérambycides de forme massive, trapue, régulièrement convexe et à antennes robustes. Elles appartiennent à la sous-famille des Lamiinae. Ce sont des coléoptères aptères, à la démarche lente, et dont l'activité est à la fois diurne et nocturne. Ils se rencontrent au sol, sur les souches et les troncs des arbres.





1 - *Lamia textor* (Linnaeus) (14-32 mm).
Mâle (à gauche) ; femelle (à droite).





2. *Morimus asper* (Sulzer) (16-38 mm).
Mâle (à gauche) ; femelle (à droite).

[1] 3 rue de la santé, F-35000 Rennes, <xgouverneur@aol.com>
[2] 1 Le Clos du Pratel, F-50300 Saint-Martin-des-Champs, <philippe.guerard@wanadoo.fr>

**Clé d'identification**

**Caractéristiques communes** : une forte dent au bord latéral du pronotum et des élytres à granulations luisantes






- 3e article des antennes de même longueur que le 1er ..... 1
- 3e article des antennes 2 à 3 fois plus long que le 1er ..... 2

1 – Antennes : chez le mâle, elles atteignent les 2/3 des élytres,
chez la femelle, elles atteignent un peu plus de la moitié des élytres..... ***Lamia textor***

2 - Antennes : chez le mâle, elles dépassent de 5 articles l'apex des élytres
chez la femelle, elles dépassent de 1 à 2 articles l'apex des élytres ..... ***Morimus asper***




***Lamia textor*** (Linnaeus, 1758)




***Morimus asper*** (Sulzer, 1776)