

## Découverte de *Pseudomogoplistes vicentae* Gorochov, 1996 dans le département du Finistère (Orthoptera, Mogoplistidae)

Franck HERBRECHT<sup>1</sup>

C'est lors d'un court séjour dans le Finistère que j'ai pu découvrir le Grillon maritime dans deux sites différents. Le premier, au niveau de la Baie des Trépassés, commune de Clédén-Cap-Sizun, m'a permis de capturer deux larves le 20/02/2007, l'une apparemment au dernier stade (longueur 9,5 mm) et l'autre moins développée. Ce site comporte une plage de galets limitée par un petit cordon dunaire peu élevé. La seconde station se situe sur la commune de Plouhinec, juste au sud de Porz Poulhan où, là encore, je n'ai observé qu'une larve âgée le 21/02/2007, au sein d'un espace de galets encadré d'une petite falaise et d'un vaste platier rocheux intertidal (fig. 1).



Figure 1.- Station de Porz Poulhan  
(Cliché : F. HERBRECHT).



Figure 2.- Photographie de l'individu collecté  
(Cliché : F. HERBRECHT).

Bien qu'il ne s'agisse que de larves, le rapport entre la taille du fémur postérieur et la longueur du corps milite en faveur de la sous-espèce *P. vicentae septentrionalis* Morère & Livory, 1999, ce qui serait biogéographiquement cohérent. Il conviendrait toutefois de vérifier ultérieurement cette appartenance lors d'une capture d'adultes.

### Répartition dans le Massif armoricain

Cette espèce a été (re-)découverte par BEAUFILS en 1998 (BEAUFILS, 1999), près de Carolles, dans la Manche. En 2002, huit données contemporaines étaient recueillies dans ce département (Stallegger, à paraître).

En 1999, LIERON le signale pour la première fois en Bretagne, en Baie de St-Brieuc (FOUILLET, 2000). En 2000, FOUILLET l'observe dans deux autres localités des Côtes-d'Armor, au Cap d'Erquy et aux Sables-d'Or-les-Pins (FOUILLET, 2001). À notre connaissance, l'espèce n'avait jamais été mentionnée dans le Finistère, et c'est donc le troisième département du Massif armoricain qui accueille des populations de cet ensifère, lequel n'est connu d'aucune autre région française.

Cependant, la distribution exacte de cette espèce n'est pas encore parfaitement connue, et il conviendrait de la rechercher dans le nord du Finistère et dans les rares sites sud-armoricains présentant un mode battu.

**Remerciements.** - Je remercie très sincèrement Claire MOUQUET de m'avoir fait partager sa documentation et Cécile MESNAGE, ma compagne, d'avoir supporté mes prospections entomologiques, au détriment de l'approvisionnement de notre petite famille en bigorneaux !

### Bibliographie

- BEAUFILS M., 1999.- Un heureux concours de circonstances. *L'Argiope*, **23** : 26-27.
- FOUILLET P., 2000.- Répartitions connues et possibles des orthoptères, mantes, phasmes et forficules de Bretagne. *Lettre de liaison de la Coordination Orthoptères de Bretagne*, **1** : 4-10.
- FOUILLET P., 2001.- Deux nouvelles stations de Grillon maritime de la Manche dans les Côtes d'Armor (22). *Lettre de liaison de la Coordination Orthoptères de Bretagne*, **2** : 5.
- MORERE J.-J. & LIVORY A., 1999.- Le Grillon maritime de la Manche : une espèce nouvelle pour la France. *L'Argiope*, **23** : 29-37.
- STALLEGGER P. [coord.], à paraître.- Atlas des Orthoptères de Normandie. Coordination Orthoptères de Normandie.

<sup>1</sup> Le Bois Barré, F-35390 Sainte-Anne-sur-Vilaine, <bois-barre@wanadoo.fr>